

14세기 유럽에서 2천500만 명의
목숨을 앗아간 페스트가
2017년에 아프리카의 섬나라
마다가스카르에서 발생했었습니다.

2018.4.1

마다가스카르에서
2017년 한해
1,800여명이
감염되었습니다.

생물테러에 악용될 경우,
페스트균을
직접 흡입함으로써
발생합니다.



대개 심한 두통, 피로, 발열, 구토와
현저한 쇠약감으로 시작되어
수양성 혈담과 함께 기침,
호흡곤란이 발생,
급속히 호흡 부전으로
진행될 수 있습니다.



페스트가 발생한 국가나
지역을 방문하는 경우,
주의가 필요합니다.
페스트가 의심되는
쥐나 야생동물, 환자,
사체에 가까이하지
않도록 해야합니다.

2018.4.1



질병관리본부
KCDC

페스트에
감염되었더라도
조기에 조치하면
치료가 가능합니다.

최근 페스트가 발생한 국가나
지역을 방문 후 페스트로
확진된 환자와 접촉하였거나
생물테러에 의해 공동으로
페스트균에 노출되었던 사람은
페스트가 의심되면
즉시 보건당국에
신고를 해야합니다.



가급적 타인과 접촉을
피하고 즉시 관할보건소나
질병관리본부 1339
콜센터로 연락 바랍니다.

1

3

3

9